

# ★ INMU Y LA DERROTA



Siempre, siempre,  
siempre voy a  
cuidar de ti

Un cuento sobre el **rotavirus**, hecho para padres

Inmu ¿Te acuerdas de lo que nos contaba papá de cuando era más pequeña y me puse muy malita y nos llevaron al hospital?



El Rotavirus es la causa más común de gastroenteritis aguda en niños.

A young girl with short brown hair in a ponytail, wearing a green shirt and blue pants, is sitting on a blue mat. She is holding a white cloth to her face, looking at a large red teddy bear. A red stethoscope is on the mat in front of her. The background is a light blue and white textured wall.

A partir de hoy vas a ser doctor y tienes que aprender a pelear contra los bichitos. Hay que estar preparados para cuando nazca el bebé.

La mayoría de los niños sufrirán una infección por rotavirus al menos una vez en los primeros 5 años de vida.

¿Ves? ¡Hay bichitos por todas partes!

El contagio se produce por vía oral-fecal, principalmente por **contacto cercano** de persona a persona, pero también por contacto con objetos o superficies duras.




Primero tenemos que limpiarlo todo con guantes y mucho cuidado.



Las medidas preventivas de higiene de manos y desinfección de objetos pueden no ser suficiente.

¡Un punto para Inmu!

El rotavirus es muy estable y puede permanecer en el medio ambiente durante semanas y meses si no se desinfecta.



¡Oh! ¡No! Se me ha pegado uno.  
Me voy a poner malita otra vez...  
me va a doler la tripa...

Los niños pueden tener varias **infecciones recurrentes** por rotavirus a lo largo de su vida. Sin embargo, su gravedad disminuye progresivamente.








Entonces tienes que vigilar  
si devuelvo o voy muchas  
veces al baño...

En caso de fiebre, diarrea persistente, o vómitos  
frecuentes hay que consultar con el servicio de pediatría.


En algunos países, entre un 39% y un 91% de padres de niños ingresados por gastroenteritis por rotavirus perdieron entre 2,3 y 6,4 días laborables.



...y llamar a papá y a mamá para que vengan del trabajo.



Los síntomas suelen durar entre 1 y 5 días. El tiempo de incubación suele ser inferior a 48 horas, aunque puede oscilar entre 1 y 7 días.



Mientras llegan, tienes que curarme.  
¡Y yo me pongo el casco para combatir los bichitos!



¡Oh! ¡No! Te has contagiado!



El 25% de las gastroenteritis, se transmiten a algún componente de la familia.

¡Elena a merendar!

¡Ahora no puedo!  
Tengo que matar  
bichitos.



Pero ¿qué haces?




Estoy enseñando a Inmu a protegerse de los bichitos, así si Pablete se pone malito, no os tenéis que ir con él al hospital.

El 25% de las gastroenteritis por rotavirus requieren hospitalización.



¡Hemos ganado!



Semanas más tarde



¡Hola Pablete!  
Siempre, siempre  
voy a cuidar de ti.





Hoy vamos a hablar de Rotavirus.



Puedes solicitar más información sobre la gastroenteritis por Rotavirus al Servicio de Pediatría.



Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid. [www.msd.es](http://www.msd.es)  
Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc.,  
Kenilworth, NJ, USA. Todos los derechos reservados.  
ES-ROT-00314 (Creado: julio 2020) Item Number: 00000

**MSDsalud**  
[www.msdsalud.es](http://www.msdsalud.es)

